

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΕΣ ΒΑΛΤΑΣ / Π2 47.ΟΛ 1(β).1 / ΠΡΓ ΚΑΝ(ΕΕ) 2115/2021		
MIC ΑΕ	Β 15ΜΕΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ		

Ζώνες καλλιέργειας : Δυτική, Ανατολική.

Ανάγκη καθολικής εφαρμογής : 10


ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ για ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Άριστος χρόνος Συγκομιδής για παραγωγή ελαιολάδου

- Ο άριστος χρόνος είναι όταν ο καρπός έχει ταυτόχρονα **μέγιστη ελαιοπεριεκτικότητα** και τα καλύτερα **ποιοτικά χαρακτηριστικά**.
- Με άλλα λόγια άριστος καρπός αυτός που είναι υψηλής βιολογικής αξίας (αυξημένες αντιοξειδωτικές ουσίες, βιταμίνες, αρώματα κλπ) και δεν είναι ένα απλό λιπαρό συστατικό.
- Γενικά η συγκομιδή της Κορωνέικης ποικιλίας πραγματοποιείται από τέλη Οκτωβρίου – μέσα Ιανουαρίου. Η συγκομιδή της Μαστοειδούς και Θρούμπας παρατείνεται έως Μάρτιο λόγω συλλογής με φυσική πτώση και μεγάλου ύψους δέντρων που δεν επιτρέπει τον άπαξ ραβδισμό συγκομιδής.

Πώς αντιλαμβάνομαι τον άριστο χρόνο

- Ο άριστος χρόνος συμπίπτει με την αλλαγή του χρώματος του καρπού από **πρασινοκίτρινο προς ιώδες**.
- Εναλλακτικά, παίρνω καρπό, κάνω τομή και παρατηρώ το εσωτερικό. Πρέπει να μην έχει μαυρίσει το εσωτερικό του καρπού ή μόλις να έχει ξεκινήσει το μαύρισμα.
- Ο καρπός πρέπει να έχει το κανονικό μέγεθος ποικιλίας:
Κορωνέϊκη: 0,8-1,2 γραμμάρια, Τσουνάτη: 2,5-3,0 γρ.



Εικόνα άριστου – υποβαθμισμένου καρπού



Άριστος



Υποβαθμισμένος

Φορτίο καρποφορίας – γεωγραφική ζώνη

- Υψηλό φορτίο καρποφορίας σημαίνει καθυστερημένη ωρίμανση και συγκομιδή σε αντίθεση με το χαμηλό φορτίο, περίπου κατά 20-30 ημέρες.
- Στις όψιμες περιοχές (ημιορεινή και ορεινή ζώνη) υπάρχει μία καθυστέρηση ωριμότητας 20-30 ημερών σε σχέση με τις πρώιμες (πεδινή ζώνη).

Μεταφορά- αποθήκευση καρπού

- Η μεταφορά και αποθήκευση από τον αγρό να γίνεται σε υφασμάτινα (γιούτινα) ή διχτυωτά σακιά ή πιστοποιημένα παλετοκιβώτια.
- Τα σακιά για όσο χρόνο παραμένουν στο χωράφι να τοποθετούνται όρθια το ένα κοντά στο άλλο και να μην στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.
- Όταν αυτά στοιβάζονται, στην καρότσα για μεταφορά στο ελαιουργείο, να μην ξεπερνούν τις 2 “ντάνες” (σειρές).
- Να μην παραμένουν τα σακιά στο κτήμα. Την ίδια μέρα να απομακρύνονται προς άλεση.

Εάν δεν ακολουθούνται οι παραπάνω πρακτικές υποβαθμίζεται ο καρπός κατά την προσωρινή μεταφορά - αποθήκευση πριν την άλεση και αναιρείται η τυχούσα σωστή επιλογή χρόνου συγκομιδής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μικρότεροι καρποί έχουν μεγαλύτερη σχέση σάρκα/πυρήνα, ωριμάζουν αργότερα από τους μεγαλύτερους και τα δέντρα πρέπει να συγκομίζονται αργότερα . Συμβαίνει κυρίως σε χρονιές μεγάλης καρποφορίας.
- Οι φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες (κυρίως θερμοκρασία) παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία ωρίμανσης και στην προσβολή καρπού από μύκητες και έντομο του δάκου.
- Σημαντική ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου προκύπτει από καθυστερημένη συγκομιδή και υπερωρίμανση των καρπών.

- Όταν υπάρχει αυξημένος δακοπληθυσμός, όσο νωρίτερα συγκομίσω, εντός των προβλεπόμενων ορίων, τόσο ασφαλέστερα για την ποιότητα του καρπού και παραγόμενου ελαιολάδου.
- Η πλήρης συγκομιδή (άδειασμα δέντρων) είναι προτιμότερο να έχει ολοκληρωθεί κοντά στις Αλκυονίδες μέρες του Ιανουαρίου.
- Όσο περισσότερο καθυστερώ τόσο περισσότερα οδηγώ α) το δέντρο σε παρειαυτοφορία (δεν παράγει ικανοποιητικά την επόμενη χρονιά) β) τον καρπό σε υποβάθμιση λόγω μυκητολογικών και άλλων προσβολών φθινοπώρου.
- Να μην χρησιμοποιούνται πλαστικά σακιά. Σοβαρός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία (πλαστικοποιητές στο λάδι) και μεγάλη υποβάθμιση του ελαιοκάρπου λόγω ανεπαρκούς αερισμού εντός.
- Έχει αποδειχθεί ότι κάθε μέρα που περνάει από τη στιγμή της συλλογής μέχρι την άλεση του καρπού αυξάνεται η οξύτητα περίπου κατά ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ.
- Αποδεκτός τρόπος συγκομιδής για την Κορωνέϊκη ποικιλία είναι ο **μηχανικός ραβδισμός** με πιστοποιημένα ραβδιστικά **μπαταρίας**.
- Η συγκομιδή απαραίτητα να γίνεται αφού **έχει παρέλθει ο συνιστώμενος χρόνος μεσοδιαστήματος φυτοφαρμάκου**, αν έχει προηγηθεί ψεκασμός.

- Όταν ο καρπός ιωδίζει (μπλαβίζει) πολύ νωρίς το φθινόπωρο δεν σημαίνει ότι ο καρπός έχει ωριμάσει και φτάσει στην βέλτιστη ελαιοπεριεκτικότητα, αλλά ότι ο καρπός έχει στρεσαριστεί λόγω κλιματολογικών συνθηκών (πχ ξηρασία - ανομβρία). Στην περίπτωση αυτή στις μικρόκαρπες ποικιλίες έχει σταματήσει η ελαιογένεση εντός του καρπού και ο ελαιώνας πρέπει να συγκομιστεί άμεσα **όταν είναι ασφαλής ο ραβδισμός των υδατικά καταπονημένων ελαιόδεντρων.**

