

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΕΣ ΒΑΛΤΑΣ / Π2 47.ΟΛ 1(β).1 / ΠΡΓ ΚΑΝ(ΕΕ) 2115/2021		
MIC ΑΕ	Β 15ΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΒΛΑΣΤΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΒΛΑΣΤΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ		

Σε ελαιώνες που κλαδεύτηκαν αυστηρά τον Φεβρουάριο – Μάρτιο και έχουν αναπτύξει πυκνή νέα βλαστηση σε μη παραγωγικά σημεία του ελαιόδεντρου.

Ζώνες καλλιέργειας : Δυτική και Ανατολική.

Ανάγκη καθολικής εφαρμογής : 2

Ένταση εφαρμογής : Ελαφριά παρέμβαση – τομές μικρής διαμέτρου.

Καλοκαιρινό λεπτό Κλάδεμα / Βλαστολόγημα ελαιόδεντρων

Στόχος εφαρμογής.

Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των δένδρων σε συνθήκες μειωμένων υδατικών αποθεμάτων και θερμικών καταπονήσεων. Προστασία κυρίως από ασθένειες με καλλιεργητικές πρακτικές.

Λειτουργία.

Αφαίρεση μικρού μόνο μέρους της βλάστησης των δέντρων μέσω της αφαίρεσης βλάστησης / λαίμαργων βλαστών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ώστε να βελτιώνονται οι συνθήκες φωτισμού και αερισμού εντός της κόμης των δέντρων. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι μυκητολογικές και άλλες προσβολές και μειώνεται η ανάγκη εφαρμογής χημικής φυτοπροστασίας στους ελαιώνες. Επιπλέον, τα καλοκαιρινά βλαστολογήματα αναστέλλουν την τάση των δέντρων για δημιουργία ζωηρής βλάστησης σε βάρος της καρποφορίας και αποτελούν μία από τις βασικότερες τεχνικές μείωσης των αναγκών του φυτού σε νερό, μείωσης δηλαδή της διαπνοής του φυτού μέσω της μείωσης της φυλλικής επιφάνειας των δέντρων ώστε τα τελευταία να μπορέσουν να ανταποκριθούν κάπως καλύτερα στις συνθήκες θερμικής και υδατικής καταπόνησης (στρες).

Τεχνική.

Δεν εφαρμόζουμε σε κλαδιά που καρποφορούν (απώλεια παραγωγής).

Είναι μια επέμβαση που εκτελείται στα ελαιόδεντρα κατά τη διάρκεια της **καλοκαιρινής περιόδου**, ολοκληρώνοντας το χειμερινό κλάδεμα και συνήθως εκτελείται στους **μήνες Ιούλιο - Αύγουστο**. Σαν το χειμερινό, το πράσινο κλάδεμα **βοηθά στην κατεύθυνση της φυτικής ανάπτυξης προς τα όργανα που αποτελούν την παραγωγική υποδομή** του φυτού.

Το καλοκαιρινό κλάδεμα είναι μια γρήγορη/εύκολη διαδικασία και εξαλείφει κυρίως:

1- Βλαστούς που βρίσκονται γενικά στην περιοχή μεταξύ του κορμού και των ριζών.



2- Ραχιαίους πυκνούς Βλαστούς, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στα κλαδιά εκτός από αυτούς που θα αφεθούν για αντικαταστάτες κλάδων / "ποδιών". Στους αντικαταστάτες που θα αφεθούν μπορεί να κοπεί μικρό τμήμα της κορυφής τους, έτσι ώστε να προωθηθεί η δημιουργία πλάγιας βλάστησης. Οι αντικαταστάτες δεν πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς το εσωτερικό του δέντρου.



3- Μη παραγωγικούς ΛΑΙΜΑΡΓΟΥΣ ευθυτενείς Βλαστούς, που θα πρέπει να αφαιρεθούν επειδή λαμβάνουν θρεπτικά συστατικά από το φυτό. **Αναπτύσσονται μετά το κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα ή την άνοιξη**, ειδικά αν γίνουν σημαντικές τομές, οι οποίες δημιουργούν ανισορροπίες στο φυτό, το οποίο, για να τις ξεπεράσει, εκπέμπει νέα βλάστηση από τυχαίους οφθαλμούς, με την ικανότητα να αναπτύσσεται γρήγορα και προς τα πάνω.





Οι λαίμαργοι που **αναπτύσσονται στο εσωτερικό μέρος** της κόμης, κλείνουν τα τμήματα που άφησε κενά ο κλαδευτής για **για να αφήσει το φως να διεισδύσει μέσα στο φύλλωμα**. Με αυτόν τον τρόπο **η σκίαση μειώνει την παραγωγικότητα** και εμφανίζεται **στάσιμη υγρασία** γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων.

Ο λαίμαργος βλαστός πρέπει να αφαιρεθεί πολλά χρόνια για να γίνει παραγωγικός.

Εργαλεία.

Όταν κόβετε βλαστούς, πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην αφαιρείτε παραγωγικούς βλαστούς ή αντικαταστάτες.

Αφαίρεση με λεπίδα / ψαλίδι ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ή σκίστε τα προσεκτικά με το χέρι για μικρού μεγέθους νεοφυείς.

Παράλληλα αφαιρέστε τα άρρωστα, συμπλεκόμενα και ξηρά κλαδιά ή βλαστούς.

Οι κοπτικές ακμές πρέπει να είναι καλά ακονισμένες, κάνοντας κοπές προς τα κάτω και προς τα έξω, οι οποίες είναι καθαρές και αποφασιστικές. **Τα εργαλεία να απολυμαίνονται** από δέντρο σε δέντρο.

-----Μη εφαρμογή υπό συνθήκες καύσωνα-----

--Το υλικό που προκύπτει είναι λεπτό και μπορεί να παραμείνει στον ελαιώνα--